

Инструкция

Дентинокс гель стоматологический.

Активная помощь при прорезывании зубов.

Местноанестезирующее + противовоспалительное действие.

Облегчает
симптомы
прорезывания
зубов

Снимает
болезненные
ощущения

Предупреждает и
уменьшает воспаление
десен, способствуя их
заживлению

Произведен в Германии

22 года эффективного применения в России

Состав: 1 грамм геля содержит:

Активные компоненты: Ромашки аптечной цветков настойка – 150,0 мг, лидокаина гидрохлорид – 3,4 мг, лауромакрогол 600 – 3,2 мг.

Вспомогательные компоненты: ксилитол 90,0 мг, сорбитол 100,0 мг, пропиленгликоль 150,0 мг, динатрия эдетат 1,0 мг, карбомер 12,0 мг, натрия гидроксид 44,0 мг, полисорбат-20 6,0 мг, натрия сахаринат 2,0 мг, левоментол 0,6 мг, вода очищенная 437,8 мг

Дентинокс:

- не содержит сахара
- не содержит консервантов, красителей, ароматизаторов
- продается без рецепта

Описание: Слегка опалесцирующий однородный гель зеленовато-желтого цвета с характерным запахом ромашки и ментола.

Фармакотерапевтическая группа:

Местноанестезирующее средство + противовоспалительное средство

Фармакологическое действие: Оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное действие. Уменьшает болезненные симптомы и воспаление десен при прорезывании зубов у детей.

Лидокаин обладает местноанестезирующим действием. Благодаря оптимально подобранному составу обеспечивает высокую эффективность даже в низкой, безопасной для детей, концентрации действующих веществ (лидокаин – 0,34%).

Лауромакрогол 600 оказывает местноанестезирующее действие, хорошо распределяется по слизистой оболочке полости рта, способствует длительному терапевтическому эффекту.

Ромашки аптечной цветков настойка оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению: Применяется в детской практике при прорезывании зубов, которое сопровождается раздражением десен, воспалением, болезненным ощущением.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость любого из компонентов препарата, дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы: если нет специального врачебного предписания, при первых признаках прорезывания зубов нанести чистым пальцем или ватной палочкой небольшое количество геля, величиной с горошину, на десну в месте прорезывания зуба и легко втереть. Процедуру повторять 2-3 раза в сутки, после еды и перед сном.

При необходимости можно использовать препарат в течение всего периода прорезывания молочных и постоянных зубов.

Побочное действие: при индивидуальной непереносимости на отдельные компоненты препарата возможна аллергическая реакция.

Передозировка: Из-за низкого содержания активных ингредиентов случаи передозировки не наблюдались. Не было зарегистрировано ни одного случая интоксикации.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами: Не известны.

Особые указания: Не допускать попадания препарата в глаза. Не содержит сахара и консервантов. Не вызывает зубной кариес.

Форма выпуска:

Гель стоматологический.

По 10 г в тубу алюминиевую с внутренним лаковым покрытием. Каждую тубу в комплекте с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности: 5 лет. 1 год после вскрытия тубы. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения: При температуре не выше 25°C. В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Лекарственное средство. Имеются противопоказания. Перед применением и назначением необходимо ознакомиться с инструкцией.

Производитель: «Дентинокс Гезельшафт фюр фармацойтише Препарате Ленк унд Шуппан КГ», Берлин, Германия